


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 公告

發文日期：中華民國97年8月26日
發文字號：防檢三字第0971484590號
附件：如文



主旨：公告「左旋莫多草」等13種農藥於毛豆之擴大使用方法與範圍如附表。

依據：農藥管理法第13條、農藥使用管理辦法第2條第1項第5款。

副本：

局長 宋 華 聰

擴大農藥使用方法與範圍

一、毛豆園雜草 (Weeds)

藥劑名稱	防除對象	每公頃 施藥量	稀釋倍 數(倍)	施藥時期及 方法	注意事項
87.3%左旋莫 多草乳劑 (S-Metolachl or)	牛筋草、芒 稷、馬唐、 藿香薊、狗 尾草、野 萵、碎米莎 草、鵝兒 腸、狗牙 根、小指 草、鱧腸、 焊菜。	1.2 公升	稀釋至 600公 升	播種覆土後， 將藥劑噴於土 壤表面。	1.施用時土壤需要 潮濕，如土壤乾 燥時，施藥後輕 輕拌土或鬆土， 可增加藥效。 2.具呼吸中等毒 性，中度眼刺激性 及強度過敏性。 3.對水生物具中等 毒性，勿使用於 「飲用水水源水 質保護區」及「飲 用水取水口一定 距離之地區」。 4.限萌芽前使用。
41%嘉磷塞 異丙胺鹽 溶液 (Glyphosate- isopropyl- ammonium)	巴拉草、香 附子、白 茅、雙穗雀 稗、毛穎雀 稗等。	4-5公升	100-120	雜草生長旺盛 至開花期，將 藥液均勻噴施 於草上。	1.不可噴及作物， 以免發生藥害。 2.限萌芽前使用， 不可噴及作物。
	狗牙根、鋪 地黍等。	5-6公升	80-100		
13.5%固殺草 溶液 (Glufosinate- ammonium)	小葉碎米 薺、鵝兒 腸、通泉 草、牛筋 草、馬齒 莧、野萵、 小葉灰藿。	3公升	稀釋至 600公 升	雜草生長旺盛 至開花期，將 藥液均勻噴施 於草上。	1.不可噴及作物， 以免發生藥害。 2.具中度口服急毒 性及呼吸急毒 性，中度皮膚急 毒性，強眼刺激 性。 3.限開花前使用。

藥劑名稱	防除對象	每公頃 施藥量	稀釋倍 數(倍)	施藥時期及 方法	注意事項
12.5%西殺草 乳劑 (Sethoxydim)	牛筋草、大 指草、野 稗、狗牙 根、畫眉草 等禾本科雜 草。	2 公升	600 公 升/公頃	禾本科雜草 3-5 葉時，全面 噴施。	1. 僅對禾本科雜 草有效。 2. 限開花前使用。
20%西殺草 乳劑 (Sethoxydim)	牛筋草、芒 稷、野稗、 大指草、雙 穗雀稗。	2公升	500	禾本科雜草 3-5 葉時，全面 噴施。	1. 僅對禾本科雜 草有效。 2. 限開花前使用。
13.2%剋草同 乳劑 (Clethodim)	牛筋草、狗 牙根、畫眉 草、大指 草、稗草等 禾本科雜 草。	0.8 公升	稀釋至 600 公 升	禾本科雜草 3-6 葉時全面 噴施。	1. 僅對禾本科雜 草有效。 2. 限開花前使用。
5.3%得殺草 乳劑 (Tepaloxym)	牛筋草、芒 稷、馬唐、 狗尾草。	1.0 公升	600 公 升/公頃	禾本科雜草 3-6 葉時，全面 均勻噴施。	1. 僅對禾本科雜草 有效。 2. 具呼吸中等毒性 及嚴重皮膚刺激性；對水生物具中 等毒性。 3. 限開花前使用。

二、毛豆炭疽病 (*Colletotrichum* spp.)

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
23%亞托敏水懸劑 (Azoxystrobin)	0.5公升	2,000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續三次。	1. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 2. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 3. 採收前14天停止用藥。

三、毛豆露菌病 (*Peronospora manchurica*)

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
23%亞托敏水懸劑 (Azoxystrobin)	0.5公升	2,000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續三次。	1. 具呼吸中等毒性及中度眼刺激性。 2. 對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 3. 採收前14天停止用藥。
35%滅達樂可濕性粉劑 (Metalaxyl)	每公斤種子用藥量3克	3公克藥劑加水10公撮	藥劑配成漿狀，與種子拌勻後播種。	拌種使用

四、毛豆葉蟬 (Leafhoppers)

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
5%克福隆乳劑 (Chlorfluazuron)	1.0公升	2,000	生育時期發現 1~2 齡幼蟲時，施藥一次。	採收前 15 天停止用藥。

五、毛豆葉蟬 (Mites)

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
5%芬普蟎水懸劑 (Fenpyroximate)	0.5公升	2,000	新芽輕微危害狀時，開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	1. 具中度眼刺激性，對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 2. 採收前14天停止用藥。
20%畢達本可濕性粉劑 (Pyridaben)	0.3-0.4公 斤	2,000	葉蟎發生時開始施藥，每 7 天施藥一次。	1. 具中度眼刺激性；對蜜蜂毒性高；對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 2. 採收前14天停止用藥。